

Пивной алкоголизм и его последствия.

В течение последних десяти лет алкоголизм молодеет. Уже никого не удивляет, что в 19-25 лет молодой человек страдает данным заболеванием, а порой становятся инвалидами. А ведь больному алкоголизмом в столь молодом возрасте еще предстоит завести семью, растить детей.

Подавляющее большинство больных начинали свой “путь” с употребления легких спиртных напитков, главным образом пива.

На сегодняшний день в обществе сложилось устойчивое мнение, что пиво – напиток, без которого невозможно общение с друзьями, прогулка с любимым человеком, выезд на природу, и т.д. Да и реклама активно поддерживает имеющееся положение вещей. На мнение наркологов практически никто не обращает внимания. А они между тем врачи настаивают на сокращении или полном запрещении рекламы пива. Повсеместно требуется проводить рекламную кампанию совсем иного направления – пивной алкоголизм довольно трудно излечим и тому несколько причин:

- во-первых, человек, ежедневно употребляющий несколько банок пива, не считает себя больным алкоголизмом, а пациента без мотивации практически невозможно вылечить;
- ритуал употребления пива четко ассоциируется с получением удовольствия. Основанные на такой взаимосвязи психо-эмоциональные рефлексы очень сложно изменить.

Начав употреблять пиво, человек практически не замечает, как минует первая стадия алкоголизма и начинается вторая, которая характеризуется увеличением устойчивости организма к алкоголю. А когда пиво уже не вызывает того радостного возбуждения то больной переходит на более крепкие спиртные напитки.

Проблема пивного алкоголизма как заболевания.

К началу второй стадии алкоголизма пациент, как правило, имеет “букет” сопутствующих заболеваний:

- избыточный вес, так называемый “пивной живот” у мужчин;
- проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- “посаженные” почки;
- половое бессилие у мужчин, так как пиво “программирует” организм на развитие по “женскому” сценарию – увеличиваются молочные железы, появляются жировые складки на бедрах, меняется голос.

Чтобы вылечить пивной алкоголизм и его последствия требуются большие усилия. Для начала необходимо убедить больного в том, что употребление пива не дурная привычка, а самая настоящая болезнь, которая требует обращение к специалистам и немедленного лечения. Нужна долгая реабилитационная работа, помощь семьи. Ну и, конечно, требуется лечение сопутствующих заболеваний, которые, как правило, обостряются в первые месяцы новой « трезвой» жизни.

Поверьте, деньгами и временем, потраченными на пиво и его употребление, можно распорядиться куда более правильно и разумно.

Будьте здоровы!